



**La gama más completa  
de productos para el  
cuidado de las aves  
de compañía.**

Tabernil®, cuidando de las aves desde 1974


**Tabernil®** 

Síntomas	Producto	Indicaciones	Dosis	Presentación
----------	----------	--------------	-------	--------------

**Nutricionales**

<b>Muda defectuosa o a destiempo</b>	<b>TABERNIL MUDA</b> <i>Mejora la muda</i> 	<p>La muda supone un proceso de estrés muy importante para las aves porque del buen estado de las plumas depende su supervivencia. Aporta las vitaminas y aminoácidos necesarios en los periodos de muda normal, intensa o a destiempo. También es útil para favorecer el emplume de los pollos y acortar el tiempo de muda fisiológica.</p>	<p>3 gotas/40 ml en el agua de bebida durante 15 días consecutivos.</p>	<p>Frasco de 20 y 100 ml</p>
<b>Estados carenciales, Convalecencias</b>	<b>TABERNIL TOTAL</b> <i>Aporta Nutrientes Esenciales</i> 	<p>Cubre las necesidades de vitaminas y aminoácidos que se necesitan en cualquier momento de la vida de las aves, principalmente debido a cambios de temperatura, dietas, etc. especialmente como "normalizador orgánico" adelantando la recuperación de las aves después de un tratamiento con antibióticos, antiparasitarios, etc.</p>	<p>8 gotas/40 ml en el agua de bebida durante 5 días seguidos dos veces al mes.</p> <p>También se puede adicionar a la pasta de cría.</p>	<p>Frasco de 20 y 100 ml</p>
<b>Preparación para una buena cría</b>	<b>TABERNIL AD<sub>3</sub>E</b> <i>Aporta Nutrientes Esenciales</i> 	<p>Preparación de las aves, garantizando la llegada a la cría en un estado óptimo. Puede ser usado durante la cría para garantizar el celo y la fertilidad. Aúna los efectos y la acción estimulante sobre testículos y ovarios de la vit. E con el beneficio sobre la puesta de la vit. A. Indicado como adyuvante en tratamientos en los que se precise concentraciones alta de vitaminas A ó E (fortalecimiento del color, hipovitaminosis, etc.).</p>	<p>4 gotas/40 ml en el agua de bebida diariamente 20 días antes del apareamiento.</p>	<p>Frasco de 20 y 100 ml</p>
<b>Para asegurar una buena cría</b>	<b>TABERNIL CRÍA</b> <i>Nutrición durante la cría</i> 	<p>Mejora el estado general de los pollos durante sus primeros días de vida, y el de los adultos durante la incubación y el cebado, épocas en las que estas aves son muy susceptibles a infecciones y desequilibrios intestinales. Estos trastornos pueden provocar diarreas responsables de retrasos y mortalidad de pollitos en la eclosión o en los primeros días de vida.</p>	<p>Añadir a razón de 5-10 g/kg de pasta de cría, o al alimento que se acostumbre a administrar durante este periodo, durante los primeros 15-20 días de la vida de los animales.</p>	<p>Caja con 10 sobres de 10 g</p>
<b>Aporte óptimo de calcio a los huesos y huevos</b>	<b>TABERNIL CALCIO</b> <i>Cáscara blanda; Postración</i> 	<p>El calcio es fundamental en muchos procesos biológicos, especialmente durante el crecimiento y la puesta. En ambos periodos es imprescindible ofrecer al animal un aporte de calcio fácilmente asimilable y que sea usado de forma rápida y eficaz por su organismo. El uso del calcio puede ser necesario durante largos periodos de la vida del ave si se presentan patologías como la puesta crónica.</p>	<p>Puesta: 15 gotas/40 ml en el agua de bebida durante 15 días antes del periodo de puesta.</p> <p>Otras indicaciones: 5 gotas/40 ml durante periodos de 5 a 7 días.</p>	<p>Frasco de 20 ml</p>
<b>Mejora la inmunidad y el crecimiento de los pollitos</b>	<b>TABERNIL COMPLEJO B</b> <i>Pollitos Débiles</i> 	<p>Mejora la viabilidad de la puesta incrementando el número de pollos que abandonan el nido. Aporta vitaminas esenciales en los primeros días tras el nacimiento. Previene estados carenciales que cursan con debilidad, síntomas nerviosos, apatía e inmovilidad, desde el periodo de saltar del nido hasta la independencia. Es también importante en todos aquellos procesos que cursan con pérdidas de sangre (parasitosis, heridas, etc.). Aves de todas las edades.</p>	<p>4 gotas/40 ml en el agua de bebida, durante 5-10 días.</p>	<p>Frasco de 20 y 100 ml</p>
<b>Cambios en el hábitat que provocan malestar en las aves</b>	<b>TABERNIL ANTI-STRESS</b> <i>Contra procesos de Estrés</i> 	<p>Aves de cualquier edad, en cualquier época del año y etapa de su vida. Siempre que se vea o se vaya a ver incrementada la posibilidad de sufrir algún tipo de estrés debido a cambios de lugar o de jaula, uniones/separaciones de aves, transportes, cambios de dietas o dietas poco variadas, condiciones ambientales adversas, concursos, etc.</p>	<p>6-8 gotas/40 ml en el agua de bebida, durante 4-5 días consecutivos.</p>	<p>Frasco de 20 ml</p>

**Higiene**

<b>Excesivo crecimiento de piel en patas y pico. Costras y descamaciones</b>	<b>TABERNIL POMADA</b> <i>Costras y Callosidades</i> 	<p>Mantiene la piel en las mejores condiciones y ayuda a los tratamientos antibacterianos a recuperar en menor tiempo su integridad. Mejora de forma sustancial la recuperación de cualquier alteración cutánea en zonas desprovistas de pluma, tales como heridas, callosidades, hiperqueratosis, costras de viruela, etc. Es un producto untuoso, por eso no debe ser usado en zonas con pluma.</p>	<p>Aplicar directamente sobre la zona afectada.</p>	<p>Tubo de 9,25 g</p>
--	---	---	---	-----------------------

Síntomas	Producto	Indicaciones	Dosis	Presentación		
<b>Medicamento sin prescripción veterinaria</b>  <b>Medicamentos con prescripción veterinaria</b>	<b>Picores, nerviosismo y abandono del nido</b>	<b>TABERNIL SPRAY (INSECTICIDA)</b> <i>Parásitos externos (incluyendo piojillo rojo)</i>		Tratamiento y prevención de infestaciones por parásitos externos. Las parasitosis, que afectan a adultos y pollos, pueden provocar abandono del nido, picaje, dermatitis, etc. En el caso del piojillo rojo, el ciclo del parásito (ácaro), tiene una fase nocturna en la que está sobre el ave y una fase diurna en la que se localiza en perchas, palillos, comederos, jaula, etc. Para un tratamiento eficaz, debe usarse el spray tanto sobre el ave como sobre el ambiente (jaula y accesorios).	Pulverizar sobre el plumaje durante unos segundos.  Pulverizar también palos, nidales, etc.	Envase spray de 150, 400 y 750 ml
	<b>Diarrea amarillenta</b>	<b>TABERNIL GENTAMICINA</b> <i>Salmonelosis, Colibacilosis</i>		Tratamiento de las infecciones intestinales más comunes en las aves causadas por microorganismos sensibles a la gentamicina.	4 gotas/40 ml en el agua de bebida durante 3-5 días seguidos.	Frasco de 20 ml
	<b>Diarrea sanguinolenta</b>	<b>TABERNIL SULFA</b> <i>Coccidiosis</i>		Tratamientos de infecciones intestinales producidas por coccidios, tanto en aves adultas como en pollos.	3 gotas/100 ml en el agua de bebida durante 3 días seguidos, descansar 2 días y aplicar 3 días más.	Frasco de 20 ml
	<b>Enfermedad Respiratoria</b>  <b>Estornudos, Secreción nasal</b>	<b>TABERNIL DOXICICLINA</b> <i>Psitacosis</i>		Tratamiento de infecciones de vías respiratorias altas que cursan con inflamación de párpados, estornudos, secreción nasal, sinusitis, rinitis y disnea. Tratamiento de psitacosis ( <i>Chlamydophila psittaci</i> ) en aves psitácidas de todas las edades. Tratamiento de procesos digestivos.	4 gotas/60 ml en el agua de bebida durante 5 días seguidos. En el tratamiento de clamidiasis en psitácidas, administrar 1 gota/100 g de peso dos veces al día durante 45 días consecutivos.	Frasco de 20 ml
	<b>Dificultad respiratoria</b>	<b>TABERNIL ANTIASMÁTICO</b> <i>Asma</i>		Alivia los síntomas de asfixia y dificultad respiratoria asociados a cuadros de asma, aerosaculitis o broncoconstricción, agudos o crónicos. Mejora la calidad de vida de las aves con enfermedades respiratorias estén o no recibiendo tratamiento.	5-10 gotas/40 ml en el agua de bebida durante 5 días consecutivos.	Frasco de 20 ml
	<b>Machos que no cantan/ infértiles/ falta de vigor</b>	<b>TABERNIL CANTO</b> <i>Estimulante Sexual</i>		Aporte de hormonas fundamental para estimular la manifestación de caracteres sexuales de los machos. Estimula el celo y la actividad sexual de los machos y consecuentemente el canto.	3-4 gotas/animal y día 2-3 veces por semana.	Frasco de 20 ml
	<b>Adelgazamiento reducción puesta</b>	<b>TABERNIL LEVAMISOL (VERMICIDA)</b> <i>Combate Gusanos Internos</i>		Tratamiento de las infestaciones intestinales producidas por gusanos redondos responsables de adelgazamiento, apatía, reducción en el número de puestas y en el número de huevos, anemias severas y en último caso la muerte. Efectivo frente a gusanos redondos ( <i>Ascaridia columbae, Heterakis spp, Capillaria spp, Amidostomum spp, etc.</i> ).	2 gotas/40 ml en el agua de bebida un solo día. Repetir el tratamiento a los 15 días si es necesario.	Frasco de 20 ml

